

Ukoliko Vam za bilo koji zadatak treba pomoć, slobodno pozovite. Postoji mogućnost kompletnog kursa, kao i individualnih časova. Zadatke prikupio i otkucao: Časlav Pejdić – 064/123-09-10.

Prvi kolokvijum iz teorijske statistike

1. Ako je funkcija gustine slučajnog vektora  $(X,Y)$ :

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} axy, & 0 \leq x \leq y, 0 < y < 2 \\ 0, & \text{inače} \end{cases}$$

proveriti da li su  $X$  i  $Y$  nezavisne slučajne veličine.

2. Slučajni vektor  $(X,Y)$  ima funkciju gustine:  $f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 2e^{-(x+y)}, & 0 \leq y \leq x < +\infty \\ 0, & \text{inače} \end{cases}$

Odrediti funkciju gustine slučajne promenljive  $Z = X + Y$ .

3. Naći jednu realizaciju slučajnog uzorka od 5 elemenata slučajne promenljive  $X$  iz normalne  $N(6; 9)$  raspodele.
4. Odrediti  $P\{0 < \bar{S}_n^2 < 13,2\}$ , gde je  $\bar{S}_n^2$  varijansa slučajnog uzorka od 20 elemenata iz normalne raspodele sa varijansom 12.

Ukoliko Vam za bilo koji zadatak treba pomoć, slobodno pozovite. Postoji mogućnost kompletnog kursa, kao i individualnih časova. Zadatke prikupio i otkucao: Časlav Pejdić – 064/123-09-10.

Prvi kolokvijum iz teorijske statistike, 7.4.2017.

III grupa

1. Data je funkcija raspodele dvodimenzionalne prekidne slučajne promenljive (X,Y):

$$F_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 0, & x < -2 \vee y < -2 \\ \frac{1}{3}, & -2 \leq x < 2 \wedge -2 \leq y < 2 \\ \frac{3}{4}, & x \geq 2 \wedge -2 \leq y < 2 \\ \frac{3}{4}, & -2 \leq x < 2 \wedge y \geq 2 \\ 1, & x \geq 2 \wedge y \geq 2 \end{cases}$$

- a) Odrediti marginalne funkcije raspodela  $F_X(x)$  i  $F_Y(y)$ .  
b) Odrediti:  $P\{X < 0; 1 < Y < 3\}$
2. Gustina raspodele slučajne promenljive X data je sa:
- $$f_X(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$
- Odrediti funkciju gustine slučajne promenljive  $Y = X^2$ .
3. Iz dve nezavisne normalne raspodele sa varijansama  $\sigma_1^2 = 1.16$  i  $\sigma_2^2 = 10.41$ , uzeta su dva nezavisna uzorka sa  $n_1 = 10$  i  $n_2 = 13$ . Odrediti verovatnoću da je uzoračka varijansa drugog uzorka bar 4 puta veća od uzoračke varijanse prvog uzorka
4. Iz  $U(0,1)$  raspodele uzet je prost slučajan uzorak obima n. Odrediti  $E(X_{(n)}^k)$ .

Ukoliko Vam za bilo koji zadatak treba pomoć, slobodno pozovite. Postoji mogućnost kompletnog kursa, kao i individualnih časova. Zadatke prikupio i otkucao: Časlav Pejdić – 064/123-09-10.

Drugi kolokvijum iz teorijske statistike – 2017

I grupa

1. Ako je  $X_1, X_2, \dots, X_n$  uzorak iz  $U(0, \theta)$ ,  $\theta > 0$ . Ispitati nepristrasnost sledećih ocena:  $2x_i$ ,  $2\bar{x}_n$  i  $x_i^2$ .
2. Metodom momenata naći ocenu parametra  $\theta$ , na osnovu uzorka obima  $n$ , iz raspodele sa gustinom:  $f(x, \theta) = e^{-(x-\theta)}$ ,  $x \geq \theta > 0$ .
3. Odrediti 98% dvostrani interval poverenja za sredinu iz normalne raspodele  $N(m, 1600)$ , za uzorak obima 100 i dobijenu uzoračku sredinu koja iznosi 52.
4. Neka je familija dopustivih funkcija  $\{E(\theta), \theta > 0\}$ . Odrediti najbolju kritičnu oblast za testiranje hipoteza:  
 $H_0: \theta = \theta_0$   
 $H_1: \theta = \theta_1, \theta_0 > \theta_1$ .

Ukoliko Vam za bilo koji zadatak treba pomoć, slobodno pozovite. Postoji mogućnost kompletnog kursa, kao i individualnih časova. Zadatke prikupio i otkucao: Časlav Pejdić – 064/123-09-10.

Drugi kolokvijum iz teorijske statistike – 2017

II grupa

1. Odrediti donju granicu za varijansu nepristrasne ocene parametra  $\theta$  iz Rao-Kramerove nejednakosti za  $P(\theta)$ ,  $\theta > 0$ .
2. Metodom momenata naći ocenu parametra  $\theta$ , za raspodelu:  $f(x, \theta) = \frac{1}{\theta+2} e^{-\frac{x}{\theta}}$ ,  $x > 0$ ,  $\theta > 0$ .
3. Odrediti 90% interval poverenja za količnik varijansi  $\frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2}$ , uzoraka obima 8, ukoliko je poznato:  $\bar{s}_{n1}^* = 6,865$ ,  $\bar{s}_{n2}^* = 5,0523$ .
4. Obeležje X ima raspodelu sa gustinom:  $f(x, \theta) = \theta e^{-\theta x}$ ,  $x > 0$ ,  $\theta > 0$ . Na osnovu uzorka obima 100 i nivoa značajnosti od 5%, odrediti kritičnu oblast za testiranje:  
 $H_0: \theta = 1$   
 $H_1: \theta = \frac{1}{2}$   
i izračunati verovatnoću greške druge vrste.

Ukoliko Vam za bilo koji zadatak treba pomoć, slobodno pozovite. Postoji mogućnost kompletnog kursa, kao i individualnih časova. Zadatke prikupio i otkucao: Časlav Pejdić – 064/123-09-10.

Ispit iz teorijske statistike – januar 2017

1. Ako je funkcija gustine slučajnog vektora  $(X,Y)$ :

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} a(2xy + 2x + y + 1), & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{inače} \end{cases}$$

Odrediti:

- konstantu  $a$ ;
  - marginalne funkcije gustine
  - uslovne funkcije gustine i ispitati da li su  $X$  i  $Y$  nezavisne slučajne promenljive.
2. Isti kao u knjizi (zadatak 5.6, strana 152)
3. Primenom testa Kolmogorova proveriti na nivou značajnosti od 0,05 da li je uzorak u saglasnosti sa  $N(32; 3,24)$ .

31; 31,4; 33,3; 33,4; 33,5; 33,7; 34,4; 34,9; 36,2

4. Dati su uzorci:

I: 3 5 7 10 4 6 7

II: 5 6 18 22 10 12 4

Uzorci su iz dve populacije sa varijansama  $\sigma_1^2 = 9$  i  $\sigma_2^2 = 25$ . Testirati hipotezu da je zbir prosečnih prinosa kukuruza ova dva skupa 20.

5. Neka je  $F(x, \theta) = \begin{cases} 1 - e^{\theta-x}, & x \geq \theta \\ 0, & \text{inače} \end{cases}$

- metodom maksimalne verodostojnosti naći ocenu nepoznatog parametra  $\theta$  na osnovu uzorka obima  $n$ .
- ispitati nepristrasnost i postojanost dobijene ocene

Ukoliko Vam za bilo koji zadatak treba pomoć, slobodno pozovite. Postoji mogućnost kompletnog kursa, kao i individualnih časova. Zadatke prikupio i otkucao: Časlav Pejdić – 064/123-09-10.

Ispit iz teorijske statistike – februar 2017

1. Ako je funkcija gustine slučajnog vektora  $(X,Y)$ :

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \frac{1+xy}{4}, & |x| < 1, |y| < 1 \\ 0, & \text{inače} \end{cases}$$

Ispitati nezavisnost slučajnih promenljivih  $X$  i  $Y$ .

2. Isti kao u knjizi (zadatak 3.3, strana 74)
3. Ako je raspodela populacije:  $X: B(m, p)$ , gde je  $0 \leq p \leq 1$  nepoznati parametar, a  $m \geq 1$  poznati, metodom momenata naći ocenu parametra  $p$ .
4. Primer 5.28 iz knjige (30 porodica, štednja)
5. Na osnovu uzorka obima  $n=74$  sa pragom značajnosti  $\alpha = 0,02$  testirati hipotezu da obeležje populacije  $X$  ima gustinu:

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{inače} \end{cases}$$

$S_n$	[0,1/4)	[1/4,1/2)	[1/2,3/4)	[3/4,1)
$M_k$	6	18	20	30

Ukoliko Vam za bilo koji zadatak treba pomoć, slobodno pozovite. Postoji mogućnost kompletnog kursa, kao i individualnih časova. Zadatke prikupio i otkucao: Časlav Pejdić – 064/123-09-10.

Ispit iz teorijske statistike

-jul 2017-

1. Novčić se baca 3 puta. Ukoliko u sva 3 bacanja padne ista strana, izvodi se još jedno dodatno. Opiši prostor elementarnih ishoda  $\Omega$  i naći raspodelu slučajnog vektora  $(X, Y)$  gde je X-broj palih grbova, a Y-broj bacanja. Naći raspodelu koord. X i Y i ispitati nezavisnost.
2. Neka je  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$  slučajan uzorak iz normalne  $N(m, \sigma^2)$  raspodele. Uporediti srednje kvadratne greške sledećih ocena za  $\sigma^2$  :  
$$\bar{S}_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2, \bar{S}_n^{*2} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$$
  
(  $MSE(T) = E_\theta(T - \theta)^2$  ).
3. Ako je funkcija gustine  $f(x, \theta) = \frac{\theta}{x^2}, x > \theta, \theta > 0$ , naći metodom maksimalne verodostojnosti najbolju ocenu parametra  $\theta$ . Ispitati nepristrasnost i postojanost dobijene ocene.
4. Obeležje X date populacije ima gustinu  $f(x, \theta) = \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, x > 0, \theta > 0$ .  
a) Naći najbolju kritičnu oblast za testiranje hipoteze  $H_0: \theta = 1$  protiv  $H_1: \theta > 1$ .  
b) Ako je  $n=100, \alpha=0,05, H_1: \theta = 2$ , naći verovatnoću greške II vrste  $\beta$ .
5. Neki zadatak iz neparametarskih metoda

Ukoliko Vam za bilo koji zadatak treba pomoć, slobodno pozovite. Postoji mogućnost kompletnog kursa, kao i individualnih časova. Zadatke prikupio i otkucao: Časlav Pejdić – 064/123-09-10.

Ispit iz teorijske statistike – septembar 2017

1. Ako je funkcija gustine slučajnog vektora  $(X,Y)$ :

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} a(2xy + 2x + y + 1), & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{inače} \end{cases}$$

Odrediti:

- konstantu  $a$ ;
  - marginalne funkcije gustine
  - uslovne funkcije gustine i ispitati da li su  $X$  i  $Y$  nezavisne slučajne promenljive.
2. Neka su  $Y_1, Y_2, Y_3$  uređene statistike slučajnog uzorka od 3 elementa i

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{inače} \end{cases}$$

Odrediti  $P\{Y_1 \geq u\}, P\{Y_3 < \frac{1}{2}\}$ . (u-medijana)

3. Neka je  $f(x, \lambda, \theta) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda(x-\theta)}, & x \geq \theta, \lambda > 0 \\ 0, & \text{inače} \end{cases}$

Metodom maksimalne verodostojnosti naći ocene nepoznatih parametara  $\lambda$  i  $\theta$  na osnovu uzorka obima  $n$ .

4. Obeležje  $X$  ima  $N(0, \sigma^2)$  raspodelu.
- Naći najbolju kritičnu oblast za testiranje hipoteze  $H_0: \sigma^2 = 1$  protiv  $H_1: \sigma^2 = 4$ .
  - Ako je  $n=10, \alpha=0,05$ , naći verovatnoću greške II vrste  $\beta$ .
5. U uzorku su dobijeni sledeći podaci o broju klijenata usluženih u 5 radnih dana: 60, 73, 48, 56, 78. Ispitati pomoću Pirsonovog  $\chi^2$  na nivou značajnosti od 5% da li je srednji broj usluženih lica isti u 5 radnih dana.



Ukoliko Vam za bilo koji zadatak treba pomoć, slobodno pozovite. Postoji mogućnost kompletnog kursa, kao i individualnih časova. Zadatke prikupio i otkucao: Časlav Pejdić – 064/123-09-10.

Ispit iz teorijske statistike – oktobar 2 2017

1. Iz 2 normalne raspodele uzeta su dva slučajna uzorka  $n_1 = 5, n_2 = 10$ . Ako je  $\sigma_1^2 = 10$ , naći  $\sigma_2^2$ , ako je  $P(\bar{S}_1^2 > 3\bar{S}_2^2) = 0,05$ .
2.  $X \sim N(2, \sigma^2), n = 10, \sum_{i=1}^{10} (x_i - 2)^2 = 0,5$ . Testirati hipoteze  $H_0: \sigma^2 = 0,03, H_1: \sigma^2 > 0,03$  na nivou značajnosti 0,05.
3. Izračunati 90% interval poverenja za  $m$  iz  $X \sim N(m, 9)$  ako je uzorak: 2,3,1,5,3,6,5,2,4,3.
4. Uzorak  $x_1, x_2, x_3, x_4$  ima raspodelu  $N(m, \sigma^2)$  i  $\hat{m}_1 = \frac{1}{4}x_1 + \frac{1}{4}x_2 + \frac{1}{4}x_3 + \frac{1}{4}x_4$ ,  
 $\hat{m}_2 = \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{8}x_2 + \frac{1}{8}x_3 + \frac{1}{4}x_4$ . Ispitati da li su ocene nepristrasne i koja je efikasnija?
5. Test Kolmogorova, nivo značajnosti 0,1. Ispitati da li je uzorak 2,3; 3,2; 5; 7,5 iz  $U[2,10]$  raspodele.

Ukoliko Vam za bilo koji zadatak treba pomoć, slobodno pozovite. Postoji mogućnost kompletnog kursa, kao i individualnih časova. Zadatke prikupio i otkucao: Časlav Pejdić – 064/123-09-10.

Ispit iz teorijske statistike – novembar 2017

1. Neka su  $X \sim N(0,1)$  i  $Y \sim N(0,1)$  nezavisne slučajne promenljive. Naći zakon raspodele slučajne promenljive  $Z = \frac{X}{Y}$ .
2. Ako su  $Y_1, Y_2$  statistike poretka uzorka obima 2, iz  $U(a, b)$ , odrediti  $E(Y_1)$
3. Ako je  $X_1, X_2, \dots, X_n$  uzorak iz populacije sa gustinom:  $f(x, \theta) = \theta x^{\theta-1}, 0 < x < 1, \theta > 0$ , odrediti dovoljnu statistiku za parametar  $\theta$ .
4. Obeležje  $X$  date populacije ima gustinu  $f(x, \theta) = \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, x > 0, \theta > 0$ .
  - a) Naći najbolju kritičnu oblast za testiranje hipoteze  $H_0: \theta = 1$  protiv  $H_1: \theta > 1$ .
  - b) Ako je  $n=100, \alpha=0,05, H_1: \theta = 2$ , naći verovatnoću greške II vrste  $\beta$ .
5. Obeležje  $X$  je broj automobila koji u nekom vremenu prođu kroz jedan presek puta. U 200 merenja konstatovano je sledeće:

Broj aut. $x_k$	0	1	2	3	4
Broj merenja $M_k$	109	65	22	3	1

Sa nivoom značajnosti  $\alpha = 0,01$  primenom  $\chi^2$  testa testirati hipotezu da  $X$  ima Puasonovu raspodelu.

Ukoliko Vam za bilo koji zadatak treba pomoć, slobodno pozovite. Postoji mogućnost kompletnog kursa, kao i individualnih časova. Zadatke prikupio i otkucao: Časlav Pejdić – 064/123-09-10.

Ispitni rok jun 2018

I grupa

1. Ako je funkcija gustine slučajnog vektora  $(X,Y)$ :

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} axy, & 0 < x < 1, 0 < y < 2 \\ 0, & \text{inače} \end{cases}$$

Odrediti:

- konstantu  $a$ ;
  - Ispitati da li su  $X$  i  $Y$  nezavisne slučajne promenljive.
2. Data je slučajna promenljiva  $X$  sa raspodelom  $U(0, \theta)$ .
- Odrediti metodom momenata ocenu parametra  $\theta$
  - Metodom maksimalne verodostojnosti naći nepristrasnu ocenu parametra  $\theta$
  - Koja od ove dve ocene je efikasnija?

3. Neka obeležje  $X$  populacije ima raspodelu

$$p(k, \theta) = P\{X = k\} = \theta^k (1 - \theta)^{1-k}, x > 0, \theta > 0.$$

Naći najbolju kritičnu oblast za testiranje  $H_0: \theta = \frac{1}{4}$ , naspram  $H_1: \theta = \frac{1}{3}$ . Da li postoji uniformno najmoćniji test za  $H_0: \theta = \frac{1}{4}$ , naspram  $H_1: \theta < \frac{1}{4}$ .

4. Merenjem vremena (u minutima) potrebnog za izradu predmeta primenom dva tehnološka procesa, dobijeno je:

57, 120, 101, 137, 119, 117, 104, 73, 53, 68, 118;

89, 30, 82, 50, 39, 22, 57, 32, 96, 31, 88.

Testirati hipotezu da su disperzije potrebnih vremena jednake, sa pragom značajnosti  $\alpha = 0,10$ .

5. Isti kao u knjizi 7.5 (Kolmogorov). (Kocka je bacana 15 puta ...).

Ukoliko Vam za bilo koji zadatak treba pomoć, slobodno pozovite. Postoji mogućnost kompletnog kursa, kao i individualnih časova. Zadatke prikupio i otkucao: Časlav Pejdić – 064/123-09-10.

Ispit iz teorijske statistike – jun 2018

II grupa

1. Ako je funkcija gustine slučajnog vektora  $(X,Y)$ :

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} a(2xy + 2x + y + 1), & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{inače} \end{cases}$$

Odrediti:

- konstantu  $a$ ;
  - marginalne funkcije gustine
  - uslovne funkcije gustine i ispitati da li su  $X$  i  $Y$  nezavisne slučajne promenljive.
2. Neka su  $Y_1, Y_2, Y_3$  uređene statistike slučajnog uzorka od 3 elementa i

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{inače} \end{cases}$$

Odrediti  $P\{Y_1 \geq u\}, P\{Y_3 < \frac{1}{2}\}$ . (u-medijana)

3. Neka je  $f(x, \lambda, \theta) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda(x-\theta)}, & x \geq \theta, \lambda > 0 \\ 0, & \text{inače} \end{cases}$

Metodom maksimalne verodostojnosti naći ocene nepoznatih parametara  $\lambda$  i  $\theta$  na osnovu uzorka obima  $n$ .

4. Obeležje  $X$  ima  $N(0, \sigma^2)$  raspodelu.
- Naći najbolju kritičnu oblast za testiranje hipoteze  $H_0: \sigma^2 = 1$  protiv  $H_1: \sigma^2 = 4$ .
  - Ako je  $n=10, \alpha=0,05$ , naći verovatnoću greške II vrste  $\beta$ .
5. U uzorku su dobijene sledeći podaci o broju klijenata usluženih u 5 radnih dana: 60, 73, 48, 56, 78. Ispitati pomoću Pirsonovog  $\chi^2$  na nivou značajnosti od 5% da li je srednji broj usluženih lica isti u 5 radnih dana.

Ukoliko Vam za bilo koji zadatak treba pomoć, slobodno pozovite. Postoji mogućnost kompletnog kursa, kao i individualnih časova. Zadatke prikupio i otkucao: Časlav Pejdić – 064/123-09-10.

Ispitni rok jul 2018

I grupa

1. Data je raspodela dvodimenzionalne slučajne promenljive  $(X, Y)$

Y/X	0	1	2
0	0,1	0	0,2
1	p	0,3	0,1

Odrediti p i naći marginalne raspodele za X i Y i ispitati da li su X i Y nezavisne slučajne promenljive.

2. Neka je  $f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{ax^2}{\theta^3}, & 0 < x < \theta \\ 0, & \text{inače} \end{cases}$

odrediti:

- konstantu  $a$
  - metodom maksimalne verodostojnosti naći ocenu nepoznatog parametra  $\theta$  na osnovu uzorka obima  $n$ , ispitati nepristrasnost dobijene ocene
  - naći jednu nepristrasnu ocenu za  $\theta$  i ispitati njenu postojanost.
3. Obeležje populacije X ima gustinu  $f(x, \theta) = \theta \cdot \ln 2 \cdot 2^{-\theta x}$ ,  $x > 0, \theta > 0$ . Naći najbolju kritičnu oblast za test hipoteze  $H_0: \theta = 1$ , naspram  $H_1: \theta = 2$ , za  $\alpha = 0,05, n = 100$ .
4. Dali su 2 uzorka iz 2 populacije sa N rasporedom sa istom varijansom i matematičkim očekivanjem  $m_1$  i  $m_2$ :
- 56, 44, 44, 46, 47, 38, 58, 41, 30, 46, 35, 49, 53  
39, 51, 57, 41, 42, 39, 32, 29, 40, 47, 55, 35
- Naći dvostrani interval 95% za  $m_1 - m_2$
  - Testirati  $H_0: m_1 = m_2$ , protiv alternativne hipoteze  $H_1: m_1 \neq m_2$
  - Testirati  $H_0: m_1 = m_2$ , protiv alternativne hipoteze  $H_1: m_1 > m_2$
5. Primenom  $\chi^2$  testa za  $\alpha = 0,05$  ispitati saglasnost iz uzorka sa N raspodelom:
- |       |       |       |       |        |
|-------|-------|-------|-------|--------|
| [1,3] | [3,5] | [5,7] | [7,9] | [9,11] |
| 2     | 3     | 7     | 11    | 7      |

Ukoliko Vam za bilo koji zadatak treba pomoć, slobodno pozovite. Postoji mogućnost kompletnog kursa, kao i individualnih časova. Zadatke prikupio i otkucao: Časlav Pejdić – 064/123-09-10.

Ispit iz teorijske statistike – septembar 2018

1. Ako je funkcija gustine slučajnog vektora  $(X,Y)$ :

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} a(2xy + 2x + y + 1), & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{inače} \end{cases}$$

Odrediti:

- konstantu  $a$ ;
  - marginalne funkcije gustine
  - uslovne funkcije gustine i ispitati da li su  $X$  i  $Y$  nezavisne slučajne promenljive.
2. Neka je  $(X_1, X_2, \dots, X_{10})$  prost slučajan uzorak iz populacije sa obeležjem  $X$  koje ima  $P(\theta)$ . Metodom maksimalne verodostojnosti na osnovu raspodele slučajne promenljive  $Y = X_1 + X_2 + \dots + X_{10}$ , naći ocenu  $\theta$  i ispitati osobine.
3. Obeležje  $X$  date populacije ima gustinu  $f(x, \theta) = \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, x > 0, \theta > 0$ .
- Naći najbolju kritičnu oblast za testiranje hipoteze  $H_0: \theta = 1$  protiv  $H_1: \theta > 1$ .
  - Ako je  $n=100, \alpha=0,10, H_1: \theta = 1,5$ , naći verovatnoću greške II vrste  $\beta$ .
4. Baca se numerisana kocka 96 puta da bi se proverila ispravnost:

Broj koji je pao	1	2	3	4	5	6
Broj pojava	12	17	14	18	8	17

Sa  $\alpha=0,05$  pomoću  $\chi^2$  testa testirati hipotezu da je kocka ispravna.

Ukoliko Vam za bilo koji zadatak treba pomoć, slobodno pozovite. Postoji mogućnost kompletnog kursa, kao i individualnih časova. Zadatke prikupio i otkucao: Časlav Pejdić – 064/123-09-10.

Ispit iz teorijske statistike – oktobar 2018

1. Ako slučajna promenljiva  $T$  ima  $t_n$  raspodelu, pokazati da slučajna promenljiva  $T^2$  ima  $F(1, n)$  raspodelu.
2. Obeležje  $X$  ima binomnu  $B(m, \theta)$  raspodelu. Na osnovu slučajnog uzorka obima  $n$  odrediti jednu dovoljnu statistiku za nepoznat parametar  $\theta$ . Da li je  $\frac{\bar{X}_n}{m}$  dovoljna statistika za  $\theta$ ?
3. a) Metodom maksimalne verodostojnosti naći ocenu parametra  $\theta$ , na osnovu uzorka obima  $n$  iz raspodele čija je funkcija gustine:  $f(x, \theta) = \frac{1}{\sigma x \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\ln x - \ln \theta)^2}{2\sigma^2}}$ ,  $\theta$  – nepoznati parametar.  
b) Naći najbolju kritičnu oblast za testiranje hipoteze  $H_0: \theta = 1$  protiv  $H_1: \theta > 1$ .
4. Merenjem prinosa pšenice na dve parcele (u mc/ha), primenom dve vrste veštačkog đubriva, dobijeno je:  
đubrivo A: 57, 53, 39, 36, 39, 12, 24, 33, 34, 29  
đubrivo B: 53, 44, 11, 19, 32, 31, 19, 24, 30, 30  
Sa nivoom značajnosti  $\alpha = 0,05$  testirati hipotezu da su varijanse prinosa jednake, protiv alternativne da su prinosi kod đubriva B homogeniji.
5. Na osnovu uzorka obima  $n=74$  sa pragom značajnosti  $\alpha = 0,02$  testirati hipotezu da obeležje populacije  $X$  ima gustinu:

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{inače} \end{cases}$$

$S_n$	[0,1/4)	[1/4,1/2)	[1/2,3/4)	[3/4,1)
$M_k$	6	18	20	30

Ukoliko Vam za bilo koji zadatak treba pomoć, slobodno pozovite. Postoji mogućnost kompletnog kursa, kao i individualnih časova. Zadatke prikupio i otkucao: Časlav Pejdić – 064/123-09-10.

Ispit iz teorijske statistike – novembar 2018

1. Odrediti regresionu pravu Y po X (Y u zavisnosti od X), ako je:

$$f(x) = \begin{cases} 15x^2y, & 0 \leq x \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{inače} \end{cases}$$

2. Neka je  $X_1, X_2, \dots, X_n$  prost slučajni uzorak iz Puasonove raspodele  $P(\lambda)$ . Dokazati da je  $T = \sum X_k$  dovoljna statistika za parametar  $\lambda$  pomoću Teoreme o faktorizaciji.

3. Slučajna promenljiva X ima Bernulijevu raspodelu sa gustinom raspodele:

$$f(x) = (2 * \theta)^x * (1 - 2 * \theta)^{1-x}, \quad x = 0,1$$

Na osnovu uzorka od n elemenata naći ocenu maksimalne verodostojnosti parametra  $\theta$  i ispitati da li je ocena nepristrasna i postojana.

4. Otpornost žice je normalna slučajna promenljiva sa nepoznatom sredinom  $m$  i nepoznatom varijansom  $\sigma^2$ . Da bi se ispitalo da li je varijansa otpornosti žice tipa A veća od varijanse otpornosti žice tipa B pet puta je meren otpor žice tipa A i sedam puta otpor žice tipa B. Dobijene su ispravljene uzoračke varijanse  $\widetilde{S}_A^2 = 0,004, \widetilde{S}_B^2 = 0,002$ . Sa nivoom značajnosti 0,05 testirati  $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$  protiv  $H_1: \sigma_1^2 > \sigma_2^2$ .
5. Koristeći test Kolmogorov-Smirnova, sa nivoom značajnosti 0,05 odrediti da li su uzorci: 3.7, 4.2, 1.3, 5.6 i 2.1, 2.7, 5.2, 2.4, 3 uzeti iz iste raspodele.



Ukoliko Vam za bilo koji zadatak treba pomoć, slobodno pozovite. Postoji mogućnost kompletnog kursa, kao i individualnih časova. Zadatke prikupio i otkucao: Časlav Pejdić – 064/123-09-10.

Ispit iz teorijske statistike – februar 2019

1. Ako je funkcija gustine slučajnog vektora  $(X,Y)$ :

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} a \frac{x}{y}, & 0 < x < 1, 1 < y < 3 \\ 0, & \text{inače} \end{cases}$$

Odrediti:

- konstantu  $a$ ;
  - marginalne funkcije gustine
  - uslovne funkcije gustine i ispitati da li su  $X$  i  $Y$  nezavisne slučajne promenljive.
2. Na osnovu slučajnog uzorka  $(X_1, X_2, \dots, X_N)$  iz populacije sa raspodelom:
- $$p(k, \theta) = (8 * \theta)^k * (1 - 8 * \theta)^{1-k}, \quad k = 0,1$$
- naći ocenu maksimalne verodostojnosti nepoznatog parametra  $\theta$ .  
Ispitati osobine dobijene ocene.
3. Iz populacije sa obeležjem  $X \sim P(3)$  izabran je uzorak od  $n$  elemenata. Odrediti raspodelu verovatnoća, matematičko očekivanje i varijansu slučajne promenljive  $Y = 3\bar{X}_n$ , gde je  $\bar{X}_n$  sredina uzorka.
4. Broj telefonskih poziva koji dnevno stižu u telefonsku centralu je slučajna promenljiva koja ima Puasonovu raspodelu sa srednjim brojem poziva 89. Izračunati približno verovatnoću da za 37 dana na telefonsku centralu pristigne između 3150 i 3350 poziva.
5. Na osnovu 40 bacanja novčića naći uniformno najjači test sa nivoom značajnosti  $\alpha = 0,05$  za testiranje hipoteze  $H_0$  da je novčić ispravan, protiv hipoteze  $H_1$  da je novčić neispravan sa verovatnoćom pada glave većom od  $\frac{1}{2}$ .

Ukoliko Vam za bilo koji zadatak treba pomoć, slobodno pozovite. Postoji mogućnost kompletnog kursa, kao i individualnih časova. Zadatke prikupio i otkucao: Časlav Pejdić – 064/123-09-10.

Ispit iz teorijske statistike – april 2019

1. Novčić se baca 3 puta. Ukoliko u sva 3 bacanja padne ista strana, izvodi se još jedno dodatno. Opiši prostor elementarnih ishoda  $\Omega$  i naći raspodelu slučajnog vektora  $(X,Y)$  gde je  $X$ -broj palih grbova, a  $Y$ -broj bacanja. Naći raspodelu koord.  $X$  i  $Y$  i ispitati nezavisnost.
2. Naći obim uzorka i najbolju kritičnu oblast za  $N(\theta, 5000^2)$  za  $H_0: \theta = 30000$ , naspram  $H_1: \theta = 35000$ . ( $\alpha = 0,01$ ;  $\beta = 0,02$ )
3. Ako je funkcija gustine  $f(x, \theta) = \frac{x}{\theta^2} e^{-\frac{x}{\theta}}$ ,  $x > 0, \theta > 0$ , naći metodom maksimalne verodostojnosti najbolju ocenu parametra  $\theta$  i ispitati nepristrasnost i efikasnost dobijene ocene.
4. Uzorak od 10 elemenata izabran je iz normalne populacije. U uzorku je dobijeno:  $\sum_{k=1}^{10} x_k = 34$ ,  $\sum_{k=1}^{10} x_k^2 = 138$ . Ako se uzorak dopuni sa sledećim elementima: 2,8; 3,5;3,8, za koliko se menja dužina 90% intervala poverenja za nepoznato matematičko očekivanje?
5. Na osnovu uzorka obima  $n=74$  sa pragom značajnosti  $\alpha = 0,02$  testirati hipotezu da obeležje populacije  $X$  ima gustinu:

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{inače} \end{cases}$$

$S_n$	[0,1/4)	[1/4,1/2)	[1/2,3/4)	[3/4,1)
$M_k$	6	18	20	30

Ukoliko Vam za bilo koji zadatak treba pomoć, slobodno pozovite. Postoji mogućnost kompletnog kursa, kao i individualnih časova. Zadatke prikupio i otkucao: Časlav Pejdić – 064/123-09-10.

Ispit iz teorijske statistike – jun 2019

1. Data je raspodela dvodimenzionalne slučajne promenljive  $(X, Y)$

Y/X	0	1	2
0	0,1	0	0,2
1	P	0,3	0,1

Odrediti p i naći marginalne raspodele za X i Y i ispitati da li su X i Y nezavisne slučajne promenljive.

2. Neka je  $f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{ax^2}{\theta^3}, & 0 < x < \theta \\ 0, & \text{inače} \end{cases}$

odrediti:

- konstantu  $a$
  - metodom maksimalne verodostojnosti naći ocenu nepoznatog parametra  $\theta$  na osnovu uzorka obima  $n$ , ispitati nepristrasnost dobijene ocene
  - naći jednu nepristrasnu ocenu za  $\theta$  i ispitati njenu postojanost.
3. Obeležje populacije X ima gustinu  $f(x, \theta) = \theta \cdot \ln 2 \cdot 2^{-\theta x}, x > 0, \theta > 0$ . Naći najbolju kritičnu oblast za test hipoteze  $H_0: \theta = 1$ , naspram  $H_1: \theta = 2$ , za  $\alpha = 0,05, n = 100$ .

4. Dali su 2 uzorka iz 2 populacije sa N rasporedom sa istom varijansom i matematičkim očekivanjem  $m_1$  i  $m_2$ :

56, 44, 44, 46, 47, 38, 58, 41, 30, 46, 35, 49, 53

39, 51, 57, 41, 42, 39, 32, 29, 40, 47, 55, 35

- Naći dvostrani interval 95% za  $m_1 - m_2$
- Testirati  $H_0: m_1 = m_2$ , protiv alternativne hipoteze  $H_1: m_1 \neq m_2$
- Testirati  $H_0: m_1 = m_2$ , protiv alternativne hipoteze  $H_1: m_1 > m_2$

5. Primenom  $\chi^2$  testa za  $\alpha = 0,05$  ispitati saglasnost iz uzorka sa  $N(m, 4)$  raspodelom:

(1,3] (3,5] (5,8] (8,12] (12,15] (15,18]

2    3    7    10    11    7

Ukoliko Vam za bilo koji zadatak treba pomoć, slobodno pozovite. Postoji mogućnost kompletnog kursa, kao i individualnih časova. Zadatke prikupio i otkucao: Časlav Pejdić – 064/123-09-10.

Ispit iz teorijske statistike – jul 2019

1. Ako slučajna promenljiva  $T$  ima  $t_n$  raspodelu, pokazati da slučajna promenljiva  $T^2$  ima  $F(1,n)$  raspodelu.
2. Obeležje  $X$  ima binomnu  $B(m, \theta)$  raspodelu. Na osnovu slučajnog uzorka obima  $n$  odrediti jednu dovoljnu statistiku za nepoznat parametar  $\theta$ . Da li je  $\frac{\bar{X}_n}{m}$  dovoljna statistika za  $\theta$ ?
3. a) Metodom maksimalne verodostojnosti naći ocenu parametra  $\theta$ , na osnovu uzorka obima  $n$  iz raspodele čija je funkcija gustine:  $f(x, \theta) = \frac{1}{\sigma x \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\ln x - \ln \theta)^2}{2\sigma^2}}$ ,  $\theta$  – nepoznati parametar.  
b) Naći najbolju kritičnu oblast za testiranje hipoteze  $H_0: \theta = 1$  protiv  $H_1: \theta > 1$ .
4. Merenjem prinosa pšenice na dve parcele (u mc/ha), primenom dve vrste veštačkog đubriva, dobijeno je:  
đubrivo A: 57, 53, 39, 36, 39, 12, 24, 33, 34, 29  
đubrivo B: 53, 44, 11, 19, 32, 31, 19, 24, 30, 30  
Sa nivoom značajnosti  $\alpha = 0,05$  testirati hipotezu da su varijanse prinosa jednake, protiv alternativne da su prinosi kod đubriva B homogeniji.
5. U tabeli su dati rezultati testa inteligencije 100 studenata:

IQ	[120,124)	[124,130)	[130,136)	[136,140)
$m_k$	10	50	35	5

Ispitati saglasnost podataka sa  $\chi^2$  - raspodelom na nivou značajnosti  $\alpha = 0,01$ .